

V 主要病害虫発生程度別面積及び防除面積

作物名	病害虫名	発生面積		被害面積		発生程度別面積 (ha)					防除面積 (ha)		概評	
		面積 (ha)	率 (%)	面積 (ha)	率 (%)	無	少	中	多	甚	実面積	延面積	初発期	発生量
水稲 104,000 ha	葉いもち	132	0.1	0	0.0	103,868	132	0	0	0	103,237	241,760	やや遅	少
	穂いもち	132	0.1	0	0.0	103,868	132	0	0	0	103,237	241,760	並	少
	紋枯病	23,448	22.5	118	0.1	80,552	23,330	118	0	0	19,308	23,200	並	やや少
	縞葉枯病	566	0.5	140	0.1	103,434	426	140	0	0	49,677	102,333	—	並
	ばか苗病	1,281	1.2	0	0.0	102,719	1,281	0	0	0	103,969	103,969	—	並
	苗立枯病	1,170	1.1	0	0.0	102,830	1,170	0	0	0	91,296	93,715	—	並
	種子伝染性細菌病	199	0.2	0	0.0	103,801	199	0	0	0	103,969	103,969	—	少
	ニカメイガ	400	0.4	0	0.0	103,600	400	0	0	0	52,077	95,332	やや早	少
	セジロウンカ	1,757	1.7	0	0.0	102,243	1,757	0	0	0	78,602	156,536	やや遅	並
	ヒメトビウンカ	27,896	26.8	964	0.9	76,104	26,932	775	189	0	99,502	195,811	やや早	多
	イネドロオイムシ	9,188	8.8	0	0.0	94,812	9,188	0	0	0	102,278	107,700	並	少
	アカヒゲ ホソミドリ カスミカメ	45,345	43.6	2,647	2.5	58,655	42,698	2,507	140	0	101,768	240,888	早	多
	イネミギワバエ	2,390	2.3	932	0.9	101,610	1,458	859	73	0	25,187	37,740	並	やや多
フタオビコヤガ	4,689	4.5	168	0.2	99,311	4,521	140	28	0	74,986	114,812	並	少	
秋まき小麦 103,500 ha	赤さび病	32,095	31.0	7,251	7.0	71,405	24,844	6,151	1,099	1	103,069	245,132	やや早	多
	うどんこ病	4,590	4.4	19	0.0	98,910	4,571	19	0	0	103,069	262,049	並	やや少
	雪腐病類	23,670	22.9	2,191	2.1	79,830	21,479	1,842	320	29	93,842	93,842	—	少
	眼紋病	4,491	4.3	664	0.6	99,009	3,827	664	0	0	18,374	18,535	—	やや少
	赤かび病	11,930	11.5	807	0.8	91,570	11,123	807	0	0	103,500	346,970	—	少
春まき小麦 (春まき) 16,681 ha	赤かび病	1,673	10.0	15	0.1	15,008	1,658	15	0	0	16,681	61,578	—	少
	ムギキモグリバエ	703	4.2	45	0.3	15,978	658	45	0	0	6,370	10,530	早	やや多
春まき小麦 (初冬まき) 1,219 ha	赤かび病	155	12.7	0	0.0	1,064	155	0	0	0	1,219	4,603	—	少
	ムギキモグリバエ	14	1.1	0	0.0	1,205	14	0	0	0	229	269	早	少

作物名	病虫害名	発生面積		被害面積		発生程度別面積 (ha)					防除面積 (ha)		概評	
		面積(ha)	率(%)	面積(ha)	率(%)	無	少	中	多	甚	実面積	延面積	初発期	発生量
大豆 40,100 ha	べと病	8,153	20.3	218	0.5	31,947	7,935	218	0	0	19,003	22,736	並	やや少
	わい化病	7,246	18.1	92	0.2	32,854	7,154	92	0	0	40,100	54,348	—	並
	マメシクイガ	5,900	14.7	239	0.6	34,200	5,661	239	0	0	40,057	86,027	並	少
	食葉性 鱗翅目幼虫	13,083	32.6	17	0.0	27,017	13,066	17	0	0	34,063	58,481	並	やや少
	タネバエ	150	0.4	0	0.0	39,950	150	0	0	0	40,100	40,100	—	少
小豆 19,100 ha	菌核病	1,052	5.5	35	0.2	18,048	1,017	35	0	0	19,009	54,734	やや遅	やや少
	灰色かび病	2,335	12.2	133	0.7	16,765	2,202	133	0	0	18,983	53,936	並	やや少
	茎疫病	459	2.4	35	0.2	18,641	424	32	3	0	3,293	4,592	—	少
	落葉病	767	4.0	0	0.0	18,333	767	0	0	0	0	0	—	少
	食葉性 鱗翅目幼虫	3,442	18.0	15	0.1	15,658	3,427	15	0	0	18,409	21,794	やや遅	やや少
菜豆 6,790 ha	菌核病	1,382	20.4	0	0.0	5,408	1,382	0	0	0	6,634	20,468	並	並
	灰色かび病	776	11.4	0	0.0	6,014	776	0	0	0	6,634	20,468	やや早	やや少
	黄化病	78	1.1	16	0.2	6,712	62	16	0	0	6,708	8,886	—	やや少
	タネバエ	57	0.8	0	0.0	6,733	57	0	0	0	6,790	6,790	—	少
ばれいしょ 50,800 ha	疫病	2,511	4.9	126	0.2	48,289	2,385	126	0	0	50,800	373,775	やや遅	少
	塊茎腐敗	1,813	3.6	53	0.1	48,987	1,760	53	0	0	50,800	373,775	—	少
	軟腐病	11,700	23.0	307	0.6	39,100	11,393	307	0	0	47,469	164,220	—	並
	黒あし病	558	1.1	14	0.0	50,242	544	14	0	0	41,155	41,277	—	並
	そうか病	9,937	19.6	2,704	5.3	40,863	7,233	2,020	529	155	40,945	40,945	—	並
	粉状そうか病	2,635	5.2	14	0.0	48,165	2,621	14	0	0	4,189	4,189	—	少
	アブラムシ類	5,890	11.6	121	0.2	44,910	5,769	121	0	0	50,800	152,859	やや早	少
てんさい 57,300 ha	褐斑病	5,760	10.1	79	0.1	51,540	5,681	79	0	0	57,300	313,199	並	少
	根腐病 (黒根病を含む)	3,008	5.2	128	0.2	54,292	2,880	128	0	0	57,300	112,645	—	少
	そう根病	118	0.2	0	0.0	57,182	118	0	0	0	717	717	—	並
	黄化病 (西部萎黄病)	627	1.1	0	0.0	56,673	627	0	0	0	56,496	219,684	—	少
	ヨトウガ (第1回)	6,365	11.1	89	0.2	50,935	6,276	89	0	0	57,300	89,732	早	やや少
	ヨトウガ (第2回)	6,476	11.3	70	0.1	50,824	6,406	70	0	0	57,300	82,679	早	少
	テンサイ モグリハナバエ	101	0.2	0	0.0	57,199	101	0	0	0	37,362	45,238	並	少

作物名	病虫害名	発生面積		被害面積		発生程度別面積 (ha)					防除面積 (ha)		概評	
		面積(ha)	率(%)	面積(ha)	率(%)	無	少	中	多	甚	実面積	延面積	初発期	発生量
たまねぎ 14,700 ha	白斑葉枯病	3,461	23.5	547	3.7	11,239	2,914	537	10	0	14,700	96,388	並	少
	軟腐病	3,660	24.9	254	1.7	11,040	3,406	252	2	0	14,700	99,942	—	少
	乾腐病	2,552	17.4	253	1.7	12,148	2,299	195	58	0	0	0	—	少
	タマネギバエ、 タネバエ	1,029	7.0	305	2.1	13,671	724	214	91	0	4,781	5,089	—	やや多
	ネギアザミウマ	14,483	98.5	5,220	35.5	217	9,263	3,570	1,600	50	14,700	93,138	早	多
	ネギハモグリ バエ	2,635	17.9	277	1.9	12,065	2,358	248	29	0	14,202	57,771	並	やや少
ねぎ 651 ha	さび病	23	3.5	0	0.0	628	23	0	0	0	651	1,571	—	少
	ネギアザミウマ	462	71.0	114	17.5	189	348	95	17	2	651	3,374	早	並
にんじん 4,640 ha	黒葉枯病	1,084	23.4	97	2.1	3,556	987	97	0	0	4,430	14,778	—	やや少
だいこん 3,270 ha	軟腐病	989	30.2	293	9.0	2,281	696	232	61	0	3,088	7,887	—	やや多
	キスジ トビハムシ	758	23.2	25	0.8	2,512	733	25	0	0	3,270	5,918	—	やや少
キャベツ 1,150 ha	コナガ	526	45.7	35	3.0	624	491	30	5	0	1,150	6,833	並	少
	ヨトウガ	486	42.3	7	0.6	664	479	7	0	0	1,150	5,731	早	少
ブロッコリー 2,560 ha	コナガ	1,442	56.3	197	7.7	1,118	1,245	183	14	0	2,560	9,466	並	やや少
	ヨトウガ	1,166	45.5	81	3.2	1,394	1,085	81	0	0	2,560	7,170	早	やや少
りんご 520 ha	モニリア病	5	1.0	0	0.0	515	5	0	0	0	520	1,040	やや遅	少
	黒星病	319	61.3	3	0.6	201	316	3	0	0	520	4,696	やや早	多
	斑点落葉病	81	15.6	15	2.9	439	66	15	0	0	520	2,300	並	やや多
	腐らん病	430	82.7	113	21.7	90	317	102	11	0	520	1,397	—	多
	ハマキムシ類	26	5.0	0	0.0	494	26	0	0	0	520	2,464	早	少
	モモシンクイガ	46	8.8	0	0.0	474	46	0	0	0	520	2,393	やや早	少
	ハダニ類	280	53.8	24	4.6	240	256	18	6	0	520	1,510	並	やや多
	キンモンホソガ	96	18.5	0	0.0	424	96	0	0	0	520	1,617	並	やや少
	ネズミ類	24	4.6	0	0.0	496	24	0	0	0	22	22	—	やや少