

V R03主要病害虫発生程度別面積及び防除面積

作物名	病害虫名	発生面積		被害面積		発生程度別面積 (ha)					防除面積 (ha)		概評	
		面積 (ha)	率 (%)	面積 (ha)	率 (%)	無	少	中	多	甚	実面積	延面積	初発期	発生量
水稲 102,300 ha	葉いもち	19	0.0	0	0.0	102,281	19	0	0	0	100,196	236,208	やや遅	少
	穂いもち	19	0.0	0	0.0	102,281	19	0	0	0	100,196	236,208	やや遅	少
	紋枯病	11,948	11.7	0	0.0	90,352	11,948	0	0	0	14,530	17,708	並	少
	縞葉枯病	888	0.9	148	0.1	101,412	740	148	0	0	69,974	129,786	—	並
	ばか苗病	1,364	1.3	0	0.0	100,936	1,364	0	0	0	102,300	102,300	—	並
	苗立枯病	1,388	1.4	44	0.0	100,912	1,344	30	14	0	87,844	93,610	—	並
	種子伝染性細菌病	85	0.1	0	0.0	102,215	85	0	0	0	102,300	102,300	—	少
	ニカメイガ	380	0.4	0	0.0	101,920	380	0	0	0	50,480	81,689	やや早	少
	セジロウンカ	2,093	2.0	0	0.0	100,207	2,093	0	0	0	97,804	203,920	並	並
	ヒメトビウンカ	8,500	8.3	148	0.1	93,800	8,352	148	0	0	95,692	200,680	やや早	やや少
	イネドロオイムシ	1,961	1.9	0	0.0	100,339	1,961	0	0	0	98,420	110,186	やや遅	少
	アカヒゲ ホソミドリ カスミカメ	29,618	29.0	754	0.7	72,682	28,864	754	0	0	101,921	236,528	並	並
	イネミギワバエ	1,538	1.5	323	0.3	100,762	1,215	323	0	0	33,390	33,390	並	やや少
フタオビコヤガ	1,201	1.2	0	0.0	101,099	1,201	0	0	0	61,562	74,599	並	少	
秋まき小麦 105,400 ha	赤さび病	28,253	26.8	4,932	4.7	77,147	23,321	4,080	852	0	105,400	241,938	やや早	多
	うどんこ病	5,692	5.4	231	0.2	99,708	5,461	231	0	0	105,400	262,467	やや早	並
	雪腐病類	12,726	12.1	1,489	1.4	92,674	11,237	1,293	154	42	96,753	96,753	—	少
	眼紋病	3,713	3.5	145	0.1	101,687	3,568	145	0	0	21,585	21,585	—	やや少
	赤かび病	7,618	7.2	718	0.7	97,782	6,900	718	0	0	105,400	364,803	—	少
春まき小麦 (春まき) 15,916 ha	赤かび病	715	4.5	0	0.0	15,201	715	0	0	0	15,916	57,341	—	少
	ムギキモグリバエ	1,024	6.4	61	0.4	14,892	963	61	0	0	7,283	12,549	やや早	やや多
春まき小麦 (初冬まき) 884 ha	赤かび病	74	8.4	0	0.0	810	74	0	0	0	884	3,336	—	少
	ムギキモグリバエ	8	0.9	0	0.0	876	8	0	0	0	244	541	やや早	少

作物名	病虫害名	発生面積		被害面積		発生程度別面積 (ha)					防除面積 (ha)		概評	
		面積(ha)	率(%)	面積(ha)	率(%)	無	少	中	多	甚	実面積	延面積	初発期	発生量
大豆 38,900 ha	べと病	6,545	16.8	174	0.4	32,355	6,371	158	16	0	19,710	23,574	並	やや少
	わい化病	2,924	7.5	9	0.0	35,976	2,915	9	0	0	38,900	56,770	—	やや少
	マメシクイガ	5,800	14.9	202	0.5	33,100	5,598	199	3	0	38,875	84,756	早	少
	食葉性 鱗翅目幼虫	9,241	23.8	239	0.6	29,659	9,002	239	0	0	32,450	58,005	並	やや少
	タネバエ	283	0.7	0	0.0	38,617	283	0	0	0	38,893	38,893	—	並
小豆 22,100 ha	菌核病	934	4.2	0	0.0	21,166	934	0	0	0	21,910	61,484	やや遅	少
	灰色かび病	2,835	12.8	35	0.2	19,265	2,800	35	0	0	22,024	61,033	やや遅	やや少
	茎疫病	239	1.1	0	0.0	21,861	239	0	0	0	3,092	3,598	—	少
	落葉病	487	2.2	0	0.0	21,613	487	0	0	0	0	0	—	少
	食葉性 鱗翅目幼虫	3,090	14.0	31	0.1	19,010	3,059	31	0	0	22,074	34,001	並	少
菜豆 6,880 ha	菌核病	658	9.6	10	0.1	6,222	648	10	0	0	6,667	20,277	並	少
	灰色かび病	762	11.1	0	0.0	6,118	762	0	0	0	6,667	20,392	やや遅	やや少
	黄化病	92	1.3	0	0.0	6,788	92	0	0	0	6,880	9,649	—	やや少
	タネバエ	51	0.7	0	0.0	6,829	51	0	0	0	6,880	6,880	—	少
ばれいしょ 48,100 ha	疫病	1,731	3.6	2	0.0	46,369	1,729	2	0	0	48,100	350,876	並	少
	塊茎腐敗	1,478	3.1	0	0.0	46,622	1,478	0	0	0	48,100	350,876	—	少
	軟腐病	2,786	5.8	34	0.1	45,314	2,752	34	0	0	47,881	149,425	—	少
	黒あし病	466	1.0	0	0.0	47,634	466	0	0	0	38,612	38,612	—	やや少
	そうか病	14,468	30.1	2,909	6.0	33,632	11,559	2,397	512	0	38,668	38,668	—	やや多
	粉状そうか病	1,234	2.6	0	0.0	46,866	1,234	0	0	0	3,162	3,162	—	少
	アブラムシ類	7,824	16.3	142	0.3	40,276	7,682	142	0	0	48,100	135,037	並	やや少
てんさい 56,800 ha	褐斑病	4,813	8.5	30	0.1	51,987	4,783	30	0	0	56,800	292,656	やや遅	少
	根腐病 (黒根病を含む)	1,956	3.4	0	0.0	54,844	1,956	0	0	0	56,561	111,599	—	少
	そう根病	27	0.0	0	0.0	56,773	27	0	0	0	0	0	—	少
	黄化病 (西部萎黄病)	679	1.2	0	0.0	56,121	679	0	0	0	55,130	180,732	—	少
	ヨトウガ (第1回)	8,652	15.2	574	1.0	48,148	8,078	574	0	0	56,800	92,493	並	並
	ヨトウガ (第2回)	5,715	10.1	80	0.1	51,085	5,635	80	0	0	56,800	94,418	並	少
	テンサイ モグリハナバエ	92	0.2	0	0.0	56,708	92	0	0	0	41,305	50,800	並	少

作物名	病虫害名	発生面積		被害面積		発生程度別面積 (ha)					防除面積 (ha)		概評	
		面積 (ha)	率 (%)	面積 (ha)	率 (%)	無	少	中	多	甚	実面積	延面積	初発期	発生量
たまねぎ 14,600 ha	白斑葉枯病	1,917	13.1	91	0.6	12,683	1,826	91	0	0	14,600	91,940	やや遅	少
	軟腐病	2,292	15.7	139	1.0	12,308	2,153	139	0	0	14,414	97,758	—	少
	乾腐病	1,800	12.3	109	0.7	12,800	1,691	109	0	0	0	0	—	少
	タマネギバエ、 タネバエ	1,103	7.6	52	0.4	13,497	1,051	52	0	0	5,455	5,846	—	並
	ネギアザミウマ	12,701	87.0	1,203	8.2	1,899	11,498	1,192	11	0	14,600	85,460	やや早	並
	ネギハモグリ バエ	1,240	8.5	139	1.0	13,360	1,101	139	0	0	14,108	53,348	並	やや少
ねぎ 641 ha	さび病	43	6.7	0	0.0	598	43	0	0	0	641	1,781	—	やや少
	ネギアザミウマ	492	76.8	203	31.7	149	289	151	52	0	641	3,761	早	やや多
にんじん 4,510 ha	黒葉枯病	651	14.4	2	0.0	3,859	649	2	0	0	4,323	13,157	—	少
だいこん 2,970 ha	軟腐病	782	26.3	82	2.8	2,188	700	82	0	0	2,802	8,195	—	やや少
	キスジ トビハムシ	975	32.8	179	6.0	1,995	796	146	30	3	2,970	6,476	—	やや多
キャベツ 1,150 ha	コナガ	665	57.8	67	5.8	485	598	40	27	0	1,150	6,772	早	並
	ヨトウガ	479	41.7	66	5.7	671	413	47	19	0	1,150	5,969	並	並
ブロッコリー 2,560 ha	コナガ	1,655	64.6	521	20.4	905	1,134	515	6	0	2,546	9,754	早	やや多
	ヨトウガ	1,296	50.6	72	2.8	1,264	1,224	69	3	0	2,546	8,790	並	並
りんご 520 ha	モニリア病	7	1.3	0	0.0	513	7	0	0	0	520	1,017	並	少
	黒星病	114	21.9	1	0.2	406	113	1	0	0	520	4,829	並	やや少
	斑点落葉病	62	11.9	0	0.0	458	62	0	0	0	520	2,540	並	やや少
	腐らん病	469	90.2	125	24.0	51	344	113	12	0	520	1,311	—	多
	ハマキムシ類	305	58.7	66	12.7	215	239	66	0	0	520	2,305	やや早	多
	モモシンクイガ	77	14.8	0	0.0	443	77	0	0	0	520	2,321	並	やや少
	ハダニ類	269	51.7	23	4.4	251	246	20	3	0	520	1,507	遅	やや多
	キンモンホソガ	131	25.2	0	0.0	389	131	0	0	0	520	1,696	並	並
	ネズミ類	39	7.5	0	0.0	481	39	0	0	0	23	23	—	やや少