

R5 主要病害虫発生程度別面積及び防除面積

R5.11.20数値と概評を修正しました。

赤字は概評に変更があったものです。

作物名	病害虫名	発生面積		被害面積		発生程度別面積 (ha)					防除面積 (ha)		概評	
		面積 (ha)	率 (%)	面積 (ha)	率 (%)	無	少	中	多	甚	実面積	延面積	初発期	発生量
水稲 93,600 ha	葉いもち	386	0.4	40	0.0	93,214	346	32	4	4	93,139	228,475	やや早	並
	穂いもち	315	0.3	40	0.0	93,285	275	32	4	4	93,139	228,475	やや早	並
	紋枯病	31,429	33.6	13,448	14.4	62,171	17,981	9,662	2,420	1,366	13,461	16,452	やや早	多
	縞葉枯病	810	0.9	0	0.0	92,790	810	0	0	0	47,997	58,563	-	並
	ばか苗病	544	0.6	0	0.0	93,056	544	0	0	0	93,600	93,733	-	やや少
	苗立枯病	1,110	1.2	0	0.0	92,490	1,110	0	0	0	86,762	89,382	-	並
	種子伝染性細菌病	120	0.1	0	0.0	93,480	120	0	0	0	93,600	93,600	-	少
	ニカメイガ	452	0.5	0	0.0	93,148	452	0	0	0	41,580	65,701	並	並
	セジロウンカ	1,819	1.9	0	0.0	91,781	1,819	0	0	0	90,992	190,901	並	並
	ヒメトビウンカ	6,863	7.3	0	0.0	86,737	6,863	0	0	0	90,992	187,172	やや早	やや少
	イネドロオイムシ	1,569	1.7	0	0.0	92,031	1,569	0	0	0	91,228	100,010	並	少
	アカヒゲ ホソミドリ カスミカメ	23,556	25.2	339	0.4	70,044	23,217	339	0	0	93,584	216,396	早	並
	イネミギワバエ	160	0.2	13	0.0	93,440	147	13	0	0	29,559	29,559	並	少
フタオビコヤガ	1,370	1.5	0	0.0	92,230	1,370	0	0	0	79,214	97,067	並	少	
秋まき小麦 130,600 ha	赤さび病	49,442	37.9	12,256	9.4	81,158	37,186	10,365	1,556	335	130,581	328,511	やや早	多
	うどんこ病	7,285	5.6	224	0.2	123,315	7,061	224	0	0	130,517	339,147	やや早	並
	雪腐病類	27,874	21.3	2,268	1.7	102,726	25,606	1,844	336	88	126,114	128,126	-	少
	眼紋病	10,074	7.7	2,525	1.9	120,526	7,549	2,295	198	32	29,917	29,917	-	やや多
	赤かび病	13,125	10.0	112	0.1	117,475	13,013	112	0	0	130,600	448,098	-	やや少
春まき小麦 (春まき) 17,738 ha	赤かび病	2,454	13.8	57	0.3	15,284	2,397	57	0	0	17,738	62,212	-	少
	ムギキモグリバエ	2,672	15.1	112	0.6	15,066	2,560	112	0	0	6,688	11,406	並	多
春まき小麦 (初冬まき) 862 ha	赤かび病	136	15.8	0	0.0	726	136	0	0	0	862	3,181	-	やや少
	ムギキモグリバエ	72	8.4	7	0.8	790	65	7	0	0	283	283	並	多

作物名	病虫害名	発生面積		被害面積		発生程度別面積 (ha)					防除面積 (ha)		概評	
		面積 (ha)	率 (%)	面積 (ha)	率 (%)	無	少	中	多	甚	実面積	延面積	初発期	発生量
大豆 43,200 ha	べと病	9,430	21.8	4	0.0	33,770	9,426	4	0	0	22,340	26,216	並	並
	わい化病	3,742	8.7	82	0.2	39,458	3,660	82	0	0	43,200	69,515	-	やや少
	マメシンクイガ	6,456	14.9	98	0.2	36,744	6,358	98	0	0	43,184	90,965	やや早	やや少
	食葉性 鱗翅目幼虫	11,742	27.2	601	1.4	31,458	11,141	577	24	0	37,611	63,207	やや早	並
	タネバエ	180	0.4	0	0.0	43,020	180	0	0	0	43,200	43,200	-	並
小豆 19,100 ha	菌核病	717	3.8	0	0.0	18,383	717	0	0	0	18,969	58,326	やや早	少
	灰色かび病	3,525	18.5	0	0.0	15,575	3,525	0	0	0	19,081	58,086	並	やや少
	茎疫病	323	1.7	26	0.1	18,777	297	26	0	0	2,503	2,546	-	やや少
	落葉病	330	1.7	0	0.0	18,770	330	0	0	0	0	0	-	並
	食葉性 鱗翅目幼虫	3,258	17.1	216	1.1	15,842	3,042	215	1	0	18,605	31,783	やや早	やや多
菜豆 5,780 ha	菌核病	288	5.0	3	0.1	5,492	285	3	0	0	5,605	17,125	やや早	やや少
	灰色かび病	385	6.7	0	0.0	5,395	385	0	0	0	5,536	17,055	やや早	やや少
	黄化病	112	1.9	0	0.0	5,668	112	0	0	0	5,780	8,172	-	やや少
	タネバエ	19	0.3	0	0.0	5,761	19	0	0	0	5,780	0	-	並
ばれいしょ 48,500 ha	疫病	2,688	5.5	275	0.6	45,812	2,413	255	20	0	48,500	385,216	並	やや少
	塊茎腐敗	2,432	5.0	133	0.3	46,068	2,299	133	0	0	48,500	372,957	-	やや少
	軟腐病	14,913	30.7	2,322	4.8	33,587	12,591	1,998	324	0	48,287	182,488	-	多
	黒あし病	1,208	2.5	73	0.2	47,292	1,135	73	0	0	39,135	39,135	-	並
	そうか病	15,005	30.9	3,906	8.1	33,495	11,099	3,051	699	156	39,135	39,135	-	多
	粉状そうか病	1,933	4.0	24	0.0	46,567	1,909	24	0	0	3,132	3,132	-	やや少
	アブラムシ類	5,109	10.5	0	0.0	43,391	5,109	0	0	0	48,500	144,863	やや早	少
てんさい 55,400 ha	褐斑病	51,300	92.6	26,232	47.4	4,100	25,068	19,455	5,286	1,491	55,400	337,230	早	多
	根腐病 (黒根病を含む)	3,891	7.0	70	0.1	51,509	3,821	70	0	0	55,157	105,109	-	少
	そう根病	300	0.5	0	0.0	55,100	300	0	0	0	0	0	-	並
	黄化病 (西部萎黄病)	502	0.9	0	0.0	54,898	502	0	0	0	53,754	148,351	-	少
	ヨトウガ (第1回)	11,395	20.6	479	0.9	44,005	10,916	474	5	0	55,400	91,265	並	やや多
	ヨトウガ (第2回)	9,439	17.0	401	0.7	45,961	9,038	396	5	0	55,400	84,490	やや早	やや多
	テンサイ モグリハナバエ	168	0.3	0	0.0	55,232	168	0	0	0	46,432	60,059	並	並

作物名	病虫害名	発生面積		被害面積		発生程度別面積 (ha)					防除面積 (ha)		概評	
		面積 (ha)	率 (%)	面積 (ha)	率 (%)	無	少	中	多	甚	実面積	延面積	初発期	発生量
たまねぎ 14,600 ha	白斑葉枯病	2,952	20.2	29	0.2	11,648	2,923	29	0	0	14,600	102,491	やや遅	少
	軟腐病	8,064	55.2	746	5.1	6,536	7,318	669	19	58	14,600	119,271	-	やや多
	乾腐病	1,428	9.8	19	0.1	13,172	1,409	19	0	0	0	0	-	少
	タマネギバエ、 タネバエ	829	5.7	128	0.9	13,771	701	100	17	11	6,594	6,691	-	やや多
	ネギアザミウマ	14,070	96.4	2,027	13.9	530	12,043	1,876	151	0	14,600	106,104	やや早	やや多
	ネギハモグリ バエ	1,710	11.7	87	0.6	12,890	1,623	80	0	7	13,746	65,327	並	やや少
ねぎ 603 ha	さび病	160	26.5	5	0.8	443	155	5	0	0	579	2,054	-	やや多
	ネギアザミウマ	485	80.4	110	18.2	118	375	66	32	12	603	4,390	並	やや多
	ネギコガ	0	0.0	0	0.0	603	0	0	0	0	502	1,547	-	-
	ネギハモグリ バエ	65	10.8	0	0.0	538	65	0	0	0	502	1,794	-	-
ながいも 1,870 ha	アブラムシ類	1	0.1	0	0.0	1,869	1	0	0	0	686	2,242	-	-
にんじん 4,310 ha	黒葉枯病	1,112	25.8	201	4.7	3,198	911	169	30	2	4,118	12,904	-	やや多
だいこん 2,780 ha	軟腐病	1,258	45.3	205	7.4	1,522	1,053	202	3	0	2,568	8,108	-	やや多
	キスジ トビハムシ	896	32.2	208	7.5	1,884	688	186	19	3	2,750	8,199	-	多
キャベツ 1,150 ha	コナガ	685	59.6	26	2.3	465	659	26	0	0	1,150	7,313	早	やや少
	ヨトウガ	239	20.8	0	0.0	911	239	0	0	0	1,150	5,923	並	少
ブロッコリー 3,060 ha	コナガ	2,210	72.2	549	17.9	850	1,661	494	55	0	3,060	15,847	早	やや多
	ヨトウガ	1,358	44.4	115	3.8	1,702	1,243	112	3	0	3,060	12,139	並	並
りんご 518 ha	モニリア病	0	0.0	0	0.0	518	0	0	0	0	518	1,073	-	少
	黒星病	38	7.3	4	0.8	480	34	3	1	0	518	5,051	やや早	少
	斑点落葉病	53	10.2	3	0.6	465	50	3	0	0	518	2,530	並	やや少
	腐らん病	518	100.0	92	17.8	0	426	82	10	0	518	1,321	-	多
	ハマキムシ類	23	4.4	0	0.0	495	23	0	0	0	518	2,297	並	少
	モモシクイガ	77	14.9	1	0.2	441	76	1	0	0	518	2,312	やや早	並
	ハダニ類	56	10.8	3	0.6	462	53	3	0	0	518	1,613	やや早	やや少
	キンモンホソガ	69	13.3	0	0.0	449	69	0	0	0	518	1,689	並	やや少