

たまねぎの白斑葉枯病(発病株率、50株調査)

振興局	普及センター	市町村	発病株率		
			6月6半旬	7月3半旬	7月6半旬
空知	空知・本所	岩見沢市	2.0%	6.0%	0%
		三笠市	0%	24.0%	0%
	空知・本所 平均		1.6%	9.6%	0%
	空知・南東部	栗山	87.0%	92.0%	48.0%
		由仁	100.0%	99.0%	99.0%
	空知・南東部 平均		91.3%	94.3%	65.0%
	空知・南西部	長沼町	0%	66.0%	88.0%
		空知・南西部 平均		0%	66.0%
空知・中空知	砂川市	0%	20.0%	15.5%	
	空知・中空知 平均		0%	20.0%	15.5%
空知 平均			25.6%	43.9%	35.1%
石狩	石狩・北部	札幌市	0%	25.0%	50.0%
		石狩・北部 平均		0%	25.0%
石狩 平均			0%	25.0%	50.0%
上川	上川・富良野	中富良野	0%	0%	12.0%
		富良野	0.7%	2.0%	7.3%
	上川・富良野 平均		0.5%	1.5%	8.5%
	上川・士別	士別市	12.0%	30.0%	40.0%
上川・士別 平均		12.0%	30.0%	40.0%	
上川 平均			4.3%	11.0%	19.0%
オホーツク	網走・本所	北見	12.5%	12.5%	17.5%
		北見(端野)	0%	3.0%	3.0%
		北見(留辺蘂)	0.5%	5.0%	8.5%
		訓子府	0%	4.0%	4.0%
	網走・本所 平均		3.3%	6.1%	8.3%
	網走・美幌	美幌	0%	0%	0%
		津別	0%	10.0%	10.0%
		大空	8.0%	6.0%	8.0%
網走・美幌 平均		2.0%	4.0%	4.5%	
網走・遠軽	湧別町	2.0%	4.7%	4.7%	
	網走・遠軽 平均		2.0%	4.7%	4.7%
オホーツク 平均			2.7%	5.3%	6.5%
十勝	十勝・東部	幕別町	8.0%	8.0%	20.0%
		十勝・東部 平均		8.0%	8.0%
十勝 平均			8.0%	8.0%	20.0%
全道平均			10.5%	19.4%	19.7%