

りんごの黒星病（発病葉率、3樹・各100葉調査）

| 支庁 | 普及センター | 市町村 | 発病葉率 | | | | |
|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 6月3半旬 | 6月6半旬 | 7月3半旬 | 8月3半旬 | 9月3半旬 |
| 後志 | 後志・北後志 | 仁木町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | 余市町 | 0% | 0% | 0% | 0.33% | 3.00% |
| | 後志・北後志 平均 | | 0% | 0% | 0% | 0.25% | 2.25% |
| 後志 平均 | | | 0% | 0% | 0% | 0.25% | 2.25% |
| 胆振 | 胆振・本所 | 壮瞥町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | 胆振・本所 平均 | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | 胆振 平均 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 渡島 | 渡島・本所 | 七飯町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | 渡島・本所 平均 | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | 渡島 平均 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 留萌 | 留萌・南留萌 | 増毛町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | 留萌・南留萌 平均 | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | 留萌 平均 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 全道平均 | | | 0% | 0% | 0% | 0.14% | 1.29% |