

野菜の食葉性鱗翅目幼虫(食害程度、10株調査)

支庁	普及センター	市町村	食害程度									
			キャベツ					ブロッコリー				
			6月3半旬	6月6半旬	7月3半旬	7月6半旬	8月3半旬	6月3半旬	6月6半旬	7月3半旬	7月6半旬	
石狩	石狩・本所	恵庭市		0	20.00	20.00			3.75	5.00	5.00	
		江別市							0	10.00	2.50	
		北広島市										
		石狩・本所 平均		0	20.00	20.00			2.50	6.67	4.17	
		石狩・北部	新篠津村						12.50	10.00	10.00	12.50
		石狩・北部 平均						12.50	10.00	10.00	12.50	
		石狩 平均		0	20.00	20.00		12.50	4.38	7.50	6.25	
空知	空知・南西	南幌町	0	0	0							
		空知・南西部 平均	0	0	0							
		空知 平均	0	0	0							
上川	上川・大雪	美瑛町								0	0.08	0.09
		東川町								0.05	0.02	0.02
		上川・大雪 平均								0.03	0.05	0.06
		上川・士別	士別市				4.00	3.00	9.00	22.00	20.00	
		上川・士別 平均	和寒町				4.00	3.00	9.00	22.00	20.00	
		上川 平均				4.00	3.00	9.00	22.00	6.68	0.05	
網走	網走・美幌	美幌	0	0	2.00							
		網走・美幌 平均	0	0	2.00							
		網走 平均	0	0	2.00							
胆振	胆振・本所	伊達市		0	0	0						
		胆振・本所 平均		0	0	0						
		胆振・東胆	むかわ町	0.88	0.50	0.50						
		胆振・東胆 平均		0.88	0.50	0.50						
		胆振 平均	0.88	0.33	0.33	0						
十勝	十勝・北部	音更町							12.50	25.00	30.00	
		十勝・北部 平均							12.50	25.00	30.00	
		十勝・東部	幕別町		0	5.00	7.50					
		十勝・東部 平均			0	5.00	7.50					
		十勝・西部	鹿追町	0	1.00	1.00						
		十勝・西部 平均		0	1.00	1.00						
		十勝 平均		0	0.50	3.00	7.50		12.50	25.00	30.00	
	全道平均		0.29	0.20	4.90	10.30	3.00	11.33	10.75	10.01	4.18	