

たまねぎのネギアザミウマ(寄生株率、25株調査)

振興局	普及センター	市町村	寄生株率 (%)		
			6月6半旬	7月3半旬	7月6半旬
空知	空知・本所	岩見沢市	70	100	100
		三笠市	100	100	100
	空知・本所 平均		76	100	100
	空知・南東部	由仁町	20	50	10
		栗山町	20	40	39.5
	空知・南東部 平均		20	43.3	29.7
	空知・南西部	長沼町	40	56	64
	空知・南西部 平均		40	56	64
空知・中空知	砂川市	16	72	76	
空知・中空知 平均		16	72	76	
空知 平均			48	72.5	71.4
石狩	石狩・北部	札幌市	4	40	60
	石狩・北部 平均		4	40	60
石狩 平均			4	40	60
上川	上川・富良野	富良野市	4	1.3	12
		中富良野町	0	0	0
	上川・富良野 平均		3	1	9
	上川・土別	土別市	0	0	12
上川・土別 平均		0	0	12	
上川 平均			2	0.7	10
林-ㇿ	網走・本所	北見市	22	26	12
		北見市 (端野)	20	5	2
		北見市 (留辺蘂)	24	44	0
		訓子府町	0	0.5	6
	網走・本所 平均		16.5	18.9	5
	網走・美幌	美幌町	0	56	16
		津別町	0	20	40
網走・美幌 平均		8	16	72	
網走・美幌 平均		2	37	36	
網走・遠軽	湧別町	28	52	69	
網走・遠軽 平均		28	52	69	
林-ㇿ 平均			14.9	30.3	26.1
十勝	十勝・東部	幕別町	92	22	58
	十勝・東部 平均		92	22	58
十勝 平均			92	22	58
全道 平均			27.1	39.3	41.7