

たまねぎのネギアザミウマ(寄生株率、25株調査)

			寄生株率（％）		
振興局	普及センター	市町村	6月6半旬	7月3半旬	7月6半旬
空知	空知・本所	岩見沢市	0	75.0	100.0
		三笠市	0	100.0	100.0
	空知・本所 平均		0	80.0	100.0
	空知・南東部	由仁町	4.0	2.0	100.0
		栗山町	2.0	1.5	75.0
	空知・南東部 平均		2.7	1.7	83.3
	空知・南西部	長沼町	69.3	65.3	58.7
	空知・南西部 平均		69.3	65.3	58.7
	空知・中空知	砂川市	8.0	4.0	16.0
空知・中空知 平均		8.0	4.0	16.0	
空知 平均			18.7	50.4	78.5
石狩	石狩・北部	札幌市	10.0	10.0	25.0
	石狩・北部 平均		10.0	10.0	25.0
	石狩 平均		10.0	10.0	25.0
上川	上川・富良野	富良野市	4.0	2.7	10.7
		中富良野町	36.0	0	0
	上川・富良野 平均		12.0	2.0	8.0
	上川・大雪	美瑛町	0	40.0	45.0
	上川・大雪 平均		0	40.0	45.0
	上川・士別	士別市	8.0	0	12.0
	上川・士別 平均		8.0	0	12.0
上川 平均			8.0	12.6	19.1
林-ㇿ	網走・本所	北見市	0	8.0	17.0
		北見市（端野）	2.5	3.0	16.0
		北見市（留辺蘂）	0.5	0	0
		訓子府町	0	0	0
	網走・本所 平均		0.8	2.8	8.3
	網走・清里	小清水町	52.0	64.0	76.0
	網走・清里 平均		52.0	64.0	76.0
	網走・美幌	美幌町	30.0	5.0	4.0
		津別町	6.0	16.0	8.0
		大空町（女満別）	8.0	6.0	4.0
網走・美幌 平均		18.5	8.0	5.0	
網走・遠軽	湧別町	28.0	32.0	45.3	
網走・遠軽 平均		28.0	32.0	45.3	
林-ㇿ 平均			15.8	16.4	22.0
十勝	十勝・本所	帯広市	6.0	52.7	34.0
	十勝・本所 平均		6.0	52.7	34.0
	十勝・東部	幕別町	10.0	92.0	96.0
	十勝・東部 平均		10.0	92.0	96.0
十勝 平均			7.6	68.4	58.8
全道 平均			14.1	31.0	41.7