

野菜の食葉性鱗翅目幼虫 (食害程度、10株調査)

振興局	普及センター	市町村	品目	食害程度				
				6月3半旬	6月6半旬	7月3半旬	7月6半旬	8月3半旬
空知	空知・南西部	南幌町	キャベツ	5.0	6.3	2.5		
		空知・南西部 平均		5.0	6.3	2.5		
	空知 平均			5.0	6.3	2.5		
石狩	石狩・本所	江別市	ブロッコリー					
		恵庭市	キャベツ		0	0	0	
	石狩・本所 平均				0	0		
	石狩・北部	新篠津村	ブロッコリー	2.5	2.5	2.5	0	5.0
	石狩・北部 平均			2.5	2.5	2.5	0	5.0
石狩 平均			2.5	0.8	0.8	0	5.0	
後志	後志・本所	真狩村	ブロッコリー	0	22.0	2.0		
		後志・本所 平均		0	22.0	2.0		
	後志 平均			0	22.0	2.0		
胆振	胆振・本所	伊達市	キャベツ	0	5.0	5.0		
		胆振・本所 平均		0	5.0	5.0		
	胆振・東胆振	むかわ町	キャベツ	0	2.0	8.0		
	胆振・東胆振 平均			0	2.0	8.0		
	胆振 平均			0	3.5	6.5		
上川	上川・大雪	東川町	ブロッコリー			5.0	8.0	34.0
		美瑛町	ブロッコリー			0	5.0	5.0
	上川・大雪 平均					2.5	6.5	19.5
	上川・土別	土別市	ブロッコリー	10.0	0	0		
		和寒町	キャベツ				2.5	10.0
上川・土別 平均			10.0	0	0	2.5	10.0	
上川 平均			10.0	0	1.7	5.2	16.3	
林-ㇿ	網走・美幌	美幌町	キャベツ	0	4.0	6.0		
		網走・美幌 平均		0	4.0	6.0		
	林-ㇿ 平均			0	4.0	6.0		
十勝	十勝・東部	幕別町	キャベツ		4.0	1.5	0	
		十勝・東部 平均			4.0	1.5	0	
	十勝・北部	音更町	ブロッコリー	7.5	10.0	7.5		
	十勝・北部 平均			7.5	10.0	7.5		
	十勝・西部	鹿追町	キャベツ	16.0	4.0	2.0		
十勝・西部 平均		16.0	4.0	2.0				
十勝 平均			11.8	6.0	3.7	0		
全道 平均			4.6	5.1	3.0	2.2	13.5	