

調査対象作物及び病害虫、調査方法及び項目、調査時期

(病害虫発生巡回調査)

作物名	病害虫名		調査方法及び項目	調査時期(月・半旬)									
				5		6		7		8		9	
				3	6	3	6	3	6	3	6	3	6
水 稲	いもち病	葉	100株、発病株率					○	○	○			
		穂	25株達観、被害初率(調査は階級値)							○			
	イネドロオイムシ		25株、卵塊数			○	○						
			25株、幼虫数				○	○					
			25株、被害葉率						○				
	斑点米カメムシ類		20回振りすくい取り成・幼虫数(牧草地・雑草地・畦畔)				○	○	○				
秋まき小麦	(ヒメトビウンカ同時調査)		20回振りすくい取り成・幼虫数(水田)						○	○			
	赤さび病		25茎(25葉)、上から2葉目の病葉率	○	○	○							
	うどんこ病		25茎(25葉)、上から2葉目の病葉率	○	○	○							
大 豆	アブラムシ類		25株50小葉、寄生株率			○	○						
小 豆	灰色かび病		100株、発病株率						○	○			
菜 豆	菌核病		100株、発病株率						○				
	灰色かび病		100株、発病株率						○				
ばれいしょ	疫病		100株、発病株率				○	○	○				
	アブラムシ類		10株20複葉、寄生虫数、優占種特記			○	○	○	○				
てんさい	褐斑病		100株、発病株率					○	○	○	○		
	ヨトウガ		50株、被害株率				○	○			○	○	
			25株、食害程度						○				
りんご	モニリア病((葉腐れ)		10樹、1樹当たり発病花葉そう数	開 花 直 前									
	黒星病		3樹、各新梢葉100枚、発病葉率			○	○	○		○		○	
	斑点落葉病		デリシヤス系3樹各新梢葉100枚、発病葉率					○		○		○	
たまねぎ	白斑葉枯病		50株、発病株率				○	○	○				
	ネギアザミウマ		25株、寄生株率				○	○	○				
野菜(注2)	食葉性鱗翅目幼虫		10株、食害程度、優占種特記			○	○	○	○	○			

(注1) 網走農業改良普及センター管内(オホーツク総合振興局)は5月6半旬と6月3半旬、その他地域は5月3半旬と5月6半旬とする。

(注2) 野菜の食葉性鱗翅目幼虫は、下表のいずれか1作期の調査を行う。

作 物	作 型	6. 3	6. 6	7. 3	7. 6	8. 3
キャベツ または ブロッコリー	春まき(7月どり)	○	○	○		
	晩春まき(8月どり)		○	○	○	
	初夏まき(9月どり)			○	○	○