


(附) 病虫害調査基準模式図

1 病害


(1) 水稻

ア いもち病

(ア) 下葉型




(イ) ずり込み型




(2) 小麦

ア 条斑病




イ 赤さび病



0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

病斑面積率


ウ うどんこ病



2% 5% 10% 20% 30% 50% 70%


病斑面積率

エ 眼紋病



指数 1 2 3 4


オ 赤かび病




指数 0 1 2 3 4 5 6 7 8

(3) ばれいしょ


ア そうか病




指数 1
(病斑 1 ~ 3 個、3 % 以下)



指数 2
(病斑 4 ~ 10 個、4 ~ 13 % 以下)



指数 3
(病斑 11 ~ 20 個、14 ~ 25 % 以下)



指数 4
(病斑 21 個以上、26 % 以上)


(4) てんさい
ア 褐斑病



イ 葉腐病



ウ 根腐病
(7) 地上部



指数

1


2

3

4

5

(イ) 地下部



指数

1

2


3

4

5

(5) だいこん


ア パーティシリウム黒点病



指数 0 0.5 1 2 3 4

(6) りんご

ア 黒星病（定点ほ調査基準）



指数 0 1 2 3 4 5

2 虫害

(1) ダイズ・小豆

ア コガネムシ



指数 1


2

3

4

(2) 豆類

ア ダイズシストセンチュウ



指数 1


2

3

4

(3) ばれいしょ

ア ジャガイモシストセンチュウ



指数 1

2

3


4

(4) てんさい

ア テンサイトビハムシ




指数 1



2




3



4

イ ヨトウガ



指数 1



2



3




4

ウ キタネコブセンチュウ



指数 1



2




3



4


(5)ねぎ

ア ネギアザミウマ



指数 1 2 3 4


イ ネギハモグリバエ



指数 1 2 3 4

(6)だいこん







ア キスジトビハムシ



指数 1 2 3 4

(7) 野菜

ア センチュウ類

ネグサレセンチュウ (だいこん)				
				
健全	よく見ると少数の白斑または褐点がみられる	白斑または褐点がわずかに見られる	白斑または褐点が全体に散見される	白斑または褐点が全体に多数見られあばた状を呈す
キタネコブセンチュウ (にんじん)				
				
ゴールが全くみとめられない	ゴールがわずかにみとめられる	ゴールが中程度 (散見) 認められる	ゴールが多数みとめられる	ゴールが極めて多数 (密集) 認められる
ネグサレセンチュウ (ごぼう)				
				
全く褐変しない	わずかに褐変する	一見して褐変が識別できる	根系の半分程度が褐変する	根系のほぼ全体が褐変する
サツマイモネコブセンチュウ (トマト)				
				
ゴールが全く認められない	ゴールがわずかに認められる	ゴールが中程度 (散見) 認められる	ゴールが多数認められサツマイモ状のものもある	ゴールが連続してサツマイモ状を呈する
正常	形状は正常、下端部よりわずかに分岐根を生ずるが切断すれば正常	寸詰まりを呈し、下端部から分岐根を生ずる	奇形が目立ち、短根あるいは中間から大きな分岐根を生ずる	奇形が甚だしく、著しい短根や股割りがある
0	1	2	3	4

指数

(8) ブロッコリー

ア ヨトウガ・モンシロチョウ



指数 1



2



3



4