

平成 29 年度

## 病害虫発生予察情報 第7号

### 7月予報

北海道病害虫防除所 平成 29 年6月 29 日

<http://www.agri.hro.or.jp/boujoshou/>

Tel:0123(89)2080 ・ Fax:0123(89)2082

季節予報（付記）によれば、7月の天気は、日本海側とオホーツク海側では、平年と同様に天気は数日の周期で変わり、太平洋側では湿った気流の影響を受ける時期もあるため、平年と同様に曇りの日が多い見込みと予報されています。気温は平年並または高い確率ともに40%、降水量は平年並の確率が40%、平年より少ないか平年より多い確率がともに30%で、7月の気温は平年よりやや高く、降水量は平年並と予報されています。

このような予報から、多めの発生が予想される病害虫は、秋まき小麦の赤かび病、小豆・菜豆のアズキノメイガ、てんさいの褐斑病、たまねぎのネギアザミウマ、りんごの黒星病があげられます。

#### 7月に注意すべき病害虫

作物名	病害虫名	発生予想	注意事項および防除対策
水稻	いもち病	発生期：やや早 発生量：並	取り置き苗は放置せず処分する。 過剰な分追肥をしない。 BLASTAMを参考にモニタリングを行い、早期発見に努める。 穂いもちに対する出穂期散布は必ず実施する。 耐性菌発生リスクを高めないために、薬剤の選択に注意する。
秋まき小麦	なまぐさ黒穂病	—*)	乳熟期から収穫前にかけてほ場内をよく観察し、本病発生の有無を確認する。 発病が認められたほ場では、汚染の拡大を防止するため、基本的に収穫作業は避け、プラウ耕などで深くすきこみ、麦稈はほ場外に持ち出さない。
ばれいしょ	疫病	発生期：やや早 発生量：並	初発後は急激にまん延するので、予察情報や気象情報を活用し、散布遅れにならないよう注意する。
てんさい	褐斑病	発生期：やや早 発生量：やや多	薬剤に対する低感受性菌や耐性菌の発生が認められているため、薬剤の選択には特に注意する。 散布遅れや散布間隔の開きすぎに注意する。
たまねぎ	ネギハモグリバエ	—*)	りん茎に幼虫が食入するのは7月以降と考えられる。 発生地帯においては、成虫食痕の確認を励行し早期防除に努める。
あぶらな科 野菜	コナガ	発生量：並	ジアミド系薬剤に対する抵抗性遺伝子の保持個体が確認されているため、薬剤の選択に注意する。
りんご	黒星病	発生期： 既発（早） 発生量：多	重点防除時期以降も防除を継続する。防除間隔の開きすぎに注意する。

\*：発生予想の対象外

## A. 水稻

いもち病（葉いもち）	発生期：やや早	発生量：並
------------	---------	-------

### 1. 発生経過と予報の根拠

- (1) いもち病は弱い雨が長期間続いたり、寡照によって水稻の抵抗力が低下すると多発しやすい。発病適温は20～25℃であり、初発危険期は平均気温が20℃、最低気温が16℃に達した頃とされている。特に、保菌苗を本田に移植した場合は発生期が早まる可能性が高い。
- (2) 予察田（品種：「きらら397」）に設置した取り置き苗（接種）での初発期は、北斗市では6月19日（平年：6月26日）と平年より早く、比布町では6月26日（平年：6月19日）と平年より遅かった。岩見沢市（平年：6月29日）では初発を認めていない。
- (3) 6月下旬に平均気温が20℃前後で全道的に降雨が認められ、葉いもち感染好適指数「BLASTAM」で感染好適日および準好適日が全道各地で散見された。
- (4) 水稻の生育は平年並である。
- (5) 主要作付品種のほとんどは葉いもち抵抗性が“弱”から“やや弱”である。
- (6) 7月の気温は平年よりやや高く、降水量は平年並と予報されている。
- (7) 以上のことから、葉いもちの発生期は平年よりやや早く、発生量は平年並と予想される。

### 2. 防除対策

- (1) 取り置き苗を本田や畦畔に放置せず処分する。また、多肥は本病の発生を助長するので窒素質肥料の過剰な分追肥をさける。
- (2) 気象情報や発生予察情報を参考にして、葉いもちの早期発見に努める。（下記コラム参照）
- (3) 水面施用剤の使用を予定している場合は各薬剤の施用適期を逃さないよう注意する。
- (4) 葉いもちの病斑を発見した場合や近隣で発生が確認された場合には直ちに防除を開始し、1週間間隔で出穂期まで防除する。
- (5) 穂いもちに対する出穂期の散布は必ず実施する（基幹防除）。なお、葉いもちの発生が多く、出穂期間が長引く場合には、1週間程度の散布間隔で穂が完全に揃うまで散布を継続する。
- (6) MBI-D剤によるいもち病防除効果の低下が懸念される水田では同剤の使用を避ける。なお、MBI-D剤を使用する水田では、防除ガイドに準拠して使用する。
- (7) QoI剤は東北地方でも耐性菌が確認されており、道内での耐性菌出現を避けるため、使用に際しては以下の点を順守する：①使用は年1回とする、②体系防除を行う場合は作用性の異なる薬剤と組み合わせる、③採種ほどは使用しない、④規定量の処理を行う。

### 葉いもち早期発見のポイント

#### ・モニタリング時期：幼穂形成期5日後ころ

BLASTAM(ブラスタム)の感染好適日から約1週間後は要注意。  
種子消毒が未実施で育苗箱施用剤、水面施用剤を使用していない場合は、  
気象情報やBLASTAMの情報を参考にして早期に防除を開始する。

#### ・モニタリング方法：水田1筆につきそれぞれ離れた4カ所で1畦10mの下葉を主体に見歩く →ひとつでも病斑があれば薬剤散布を開始する

(BLASTAMの情報は北海道病害虫防除所のホームページで見ることができます。)

ニカメイガ	発生期：並	発生量：少
-------	-------	-------

### 1. 発生経過と予報の根拠

- (1) これまでの気象経過から、発生期は平年並と予想される。
- (2) 一般田における前年の発生量は少なかったことから、越冬密度は低いと推測され、発生量は平年より少ないと予想される。

### 2. 防除対策

- (1) 成虫発生最盛期は通常7月中旬から8月中旬頃であり、多発田では成虫発生最盛期およびその7～10日後に茎葉散布を実施する。

**ウンカ類 発生期（第2回）：並 発生量：並**

**1. 発生経過と予報の根拠**

- (1) 予察田の畦畔すくい取りでは、ヒメトビウンカ第1回成虫の捕獲頭数は、比布町および北斗市では平年並で、長沼町では平年より少なかった。発生期はいずれの地点も平年よりやや遅かった。
- (2) 予察田におけるすくい取りでは、比布町でのみ成虫が認められているが、捕獲頭数は平年より少ない。
- (3) 予察灯調査によるヒメトビウンカ第1回成虫の誘殺開始期は、比布町で6月19日（平年：6月5日）と平年より遅い。長沼町（平年：6月23日）、北斗市（平年：6月20日）では誘殺が認められていない。
- (4) 予察灯調査によるセジロウンカの誘殺は、いずれの地点も認められていない。
- (5) 7月の気温は平年よりやや高く、降水量は平年並と予報されている。
- (6) 以上のことから、第2回成虫の発生期は平年並で、発生量は平年並と予想される。

**2. 防除対策**

- (1) 多発による被害が予想される水田では、防除ガイドに準拠し、カメムシとの同時防除を実施する。
- (2) 吸汁害が発生するのは、7月下旬以降の第2回成虫発生時に株当たり寄生頭数が50頭（20回すくい取り換算頭数で成虫1,800頭）以上となった場合である。

**イネドロオイムシ 発生期：既発（並） 発生量：やや少**

**1. 発生経過と予報の根拠**

- (1) 予察田における成虫の初発期は長沼町で平年より早く、北斗市では平年よりやや早かった。比布町では成虫が認められなかった。産卵初発期は長沼町および北斗市で平年並で、比布町では平年より遅かった。
- (2) 予察田における卵塊密度は、長沼町および北斗市では平年よりやや低かった。比布町では平年より低かった。
- (3) 6月3半旬の巡回調査において、卵塊が確認された地点はわずかで、卵塊数が要防除水準を超えた地点はなかった。
- (4) 以上のことから、発生量は平年よりやや少ないと予想される。

**2. 防除対策**

- (1) 老齢幼虫に対する防除効果は劣るので、防除要否は早めに判断する。
- (2) 薬剤散布は防除ガイドに準拠して実施する。

**アカヒゲホソミドリカスミカメ（第2回） 発生期：並 発生量：並**

**1. 発生経過と予報の根拠**

- (1) 本種は第2回成虫が7月に発生し、水田に侵入する。成虫と幼虫がともに籾を加害する。7月の気象が高温少雨に経過した場合は第2回成虫の発生量が多くなる。
- (2) 水田畦畔におけるすくい取りによる成虫捕獲開始期は比布町で6月19日（平年：6月11日）で平年より遅かった。長沼町（平年：6月10日）、北斗市（平年：6月3半旬）では捕獲が認められていない。
- (3) 秋まき小麦すくい取りによる捕獲成虫数は、長沼町で平年よりやや少なく、比布町では平年よりやや多かった。長沼町では6月3半旬、比布町では6月2半旬から捕獲が認められている。
- (4) 7月の気温は平年よりやや高く、降水量は平年並と予報されている。
- (5) 以上のことから、第2回成虫の発生期、発生量はともに平年並と予想される。

**2. 防除対策**

- (1) 第1回成虫の発生期（6月下旬から7月上旬）に、本種が増殖する水田周辺のイネ科雑草を刈り取る。
- (2) 茎葉散布は出穂期とその7日後の2回を基幹防除として実施する。
- (3) ジノテフラン液剤またはエチプロール水和剤Fを使用する場合、基幹防除を出穂期7～10日後の1回散布に省略できる。なお、追加散布については、従来どおりの基準で行う。
- (4) 水面施用剤は、出穂期から出穂7日後に施用すると出穂2週間後まで残効が認められ、出穂期およびその7日後の茎葉散布2回と同等の防除効果が期待できる。

**フタオビコヤガ（第2回） 発生期：並 発生量：少**

**1. 発生経過と予報の根拠**

- (1) 予察田における第1回幼虫の発生および被害は、長沼町、比布町、北斗市いずれにおいても認められていない。
- (2) 一般田における前年の発生量は少なかったことから、越冬密度は低いと推測される。
- (3) 7月の気温は平年よりやや高く、降水量は平年並と予報されている。
- (4) 以上のことから、第2回幼虫の発生期は平年並、発生量は少ないと予想される。

**2. 防除対策**

- (1) 7月下旬に10株について幼虫被害を調査し、被害株率が100%に達し、かつ被害葉率が65%を越えていたら防除を実施する。

**農薬による蜜蜂への被害に注意しましょう!!**

蜜蜂は蜂蜜の生産ばかりでなく花粉交配用として非常に重要な生き物ですが、近年、道内では、農薬によると見られる被害が、水田地帯を中心に毎年度発生しており、深刻な状況にあります。

蜜蜂は、蜜を集めるために6kmも飛行すると言われており、農薬散布を予定しているほ場近くで飼われている場合には、巣箱を移動してもらうか、蜜蜂に影響の少ない薬剤を選ぶとともに、気象条件等を勘案し、活動が活発となる時間帯を避けましょう。

また、農薬散布については、使用する薬剤・時期などを養蜂家に的確に情報提供するとともに、事前の話し合いを行うようにしましょう。

国の蜜蜂被害調査結果や関係する通知等については、農林水産省ホームページをご覧ください。

[http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n\\_mitubati/honeybee.html](http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_mitubati/honeybee.html)

**B. 秋まき小麦**

**赤かび病 発生量：やや多**

**1. 発生経過と予報の根拠**

- (1) 赤かび病は出穂期から開花期頃に雨天が続くと多くなり、その後の降雨により病勢が進展する。
- (2) 地域によっては6月中旬の降雨が秋まき小麦の開花期と重なったと考えられる。
- (3) 以上のことから、発生量は平年よりやや多いと予想される。

**2. 防除対策**

- (1) 薬剤の散布間隔は7日、防除回数は合計2回を基本とし、開花期間が長引いたり、ばらつく場合には追加防除も検討する。
- (2) ミクロドキウム・ニパーレでは、クレソキシムメチル剤およびチオファネートメチル剤に対する耐性菌が広範囲で確認されていることから、本菌による赤かび病の多発が懸念される地域では使用しない。
- (3) 刈り遅れのないように注意し、刈取後収穫物を速やかに乾燥する。赤かび粒を除去するため、粒厚選別および比重選別を実施する。

**アブラムシ類** 発生期：やや遅 発生量：やや少

#### 1. 発生経過と予報の根拠

- (1) 小麦の生育は、平年並に推移している。
- (2) 予察ほにおいて、ムギヒゲナガアブラムシは、長沼町（平年初発期：6月4半旬）、訓子府町（同6月5半旬）ともに穂への寄生が認められていない。両地点における初発期が6月5～6半旬のムギクビレアブラムシも、発生が認められていない。
- (3) 7月の気温は平年よりやや高いものの、降水量は平年並と予報されている。
- (4) 以上のことから、発生期は平年よりやや遅く、発生量は平年よりやや少ないと予想される。

#### 2. 防除対策

- (1) 1穂当たりの寄生密度が7～11頭に達すると収量に影響する。穂への寄生密度は出穂の10～20日後に高まるので、この時期の発生状況に注意する。ただし、寄生の認められる穂が45%を越えない場合には、このような密度に達しないので薬剤防除は不要である。

### C. 春まき小麦

**赤かび病** 発生量：並

#### 1. 発生経過と予報の根拠

- (1) 赤かび病は出穂期から開花期頃に雨天が続くと多くなり、その後の降雨により病勢が進展する。
- (2) 7月の気温は平年よりやや高く、降水量は平年並と予報されている。
- (3) 以上のことから、発生量は平年並と予想される。

#### 2. 防除対策

- (1) 薬剤の散布は開花始から行い、散布間隔は7日、防除回数は合計3回（抵抗性“やや弱”の「ハルユタカ」では4回）を基本とし、開花期間が長引いたり、ばらつく場合には追加防除も検討する。
- (2) 刈り遅れのないように注意し、刈取後収穫物を速やかに乾燥する。赤かび粒を除去するため、粒厚選別および比重選別を実施する。

### D. 豆類

**べと病（大豆）** 発生期：並 発生量：並

#### 1. 発生経過と予報の根拠

- (1) べと病は第一次伝染源が種子であることが多く、多雨や多湿時、密植や過繁茂で風通しが悪いときに多発する。
- (2) 一般ほでは発生が見られるものの、近年は多発していない。
- (3) 大豆の生育状況は平年並である。
- (4) 7月の気温は平年よりやや高く、降水量は平年並と予報されている。
- (5) 以上のことから、発生期は平年並で、発生量は平年並と予想される。

#### 2. 防除対策

- (1) 本病による被害が出やすい黒大豆と抵抗性が“弱”の黄大豆および青大豆品種では、防除ガイドに準拠して薬剤散布を行う。それ以外の黄大豆ならびに青大豆品種では防除の必要はない。
- (2) 本病の要防除水準は、開花始の上位葉の病斑面積率2.5%（1小葉当たりの病斑個数約30個）である。

**菌核病** 発生期：並 発生量：並

#### 1. 発生経過と予報の根拠

- (1) 菌核病は花卉感染が主体であり、開花期以降の日照が少なく多湿な場合に多発する。また、感染源となる子のう盤の形成は、茎葉によって地表面がうっぺいされるほど良好となる。
- (2) 豆類の生育は、菜豆は平年よりやや遅いものの、大豆、小豆では平年並である。
- (3) 7月の気温は平年よりやや高く、降水量は平年並と予報されている。
- (4) 以上のことから、発生期は平年並で、発生量は平年並と予想される。

#### 2. 防除対策

- (1) 開花時期に注意し、薬剤散布にあたっては、大豆では開花始から10～15日後、小豆では7～10日後、菜豆では5～7日後に1回目の散布を行い、その後必要に応じて、10日間隔で計2～3回散布する。

**灰色かび病 発生期：並 発生量：やや少**

**1. 発生経過と予報の根拠**

- (1) 灰色かび病は開花期以降の天候が低温で多湿な場合に多発する。また、過繁茂状態は本病の進展を助長する。
- (2) 豆類の生育は、菜豆は平年よりやや遅いものの、大豆、小豆では平年並である。
- (3) 7月の気温はやや高く、降水量は平年並と予報されている。
- (4) 以上のことから、発生期は平年並で、発生量は平年よりやや少ないと予想される。

**2. 防除対策**

- (1) 薬剤の散布時期、散布間隔、散布回数は菌核病に準ずる。
- (2) 耐性菌の出現を防ぐため、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を行う。
- (3) ジカルボキシイミド系剤に対する耐性菌が全道で認められており、一部地域ではフルアジナム剤に対する耐性菌が認められているので、防除ガイドに準拠して適切な薬剤防除を実施する。

**茎疫病（大豆・小豆） 発生量：並**

**1. 発生経過と予報の根拠**

- (1) 茎疫病は土壌が湿潤な条件で発生し、比較的気温が高い場合に多発する。なお、7月中旬以前に発病すると被害が大きくなる。
- (2) 7月の気温は平年よりやや高いものの、降水量は平年並と予報されている。
- (3) 以上のことから、発生量は平年並と予想される。

**2. 防除対策**

- (1) 転換畑や排水性の不良なほ場では排水対策を講じる。また、培土処理は本病の発病を軽減できる。
- (2) 開花期前半までの発病を抑えることを目安にし、発病前から予防的に薬剤散布する。発病後に薬剤散布しても効果がないので、気象情報により大雨が予想された場合はその前に散布する。

**アズキノメイガ（小豆・菜豆） 発生量：やや多**

**1. 発生経過と予報の根拠**

- (1) 前年の発生量はやや多かったことから、越冬密度は平年よりやや高いと推測される。
- (2) 7月の気温は平年よりやや高いと予報されている。
- (3) 以上のことから、発生量は平年よりやや多いと予想される。

**2. 防除対策**

- (1) 防除ガイドに準拠し、産卵盛期の7月下旬から8月中旬に薬剤散布を実施する。

**食葉性鱗翅目幼虫（大豆・小豆） 発生期：やや遅 発生量：やや少**

**1. 発生経過と予報の根拠**

- (1) 大豆では開花期から莢伸長期に葉を食害されると最も収量に影響する。この時期の食害葉面積率が20%に達すると約5%の減収となる。
- (2) 予察ほにおける食害は、6月4半旬時点で長沼町、訓子府町ともに大豆、小豆いずれにおいても認められていない。
- (3) てんさいにおけるヨトウガの産卵量は平年よりやや少ない（てんさいのヨトウガの項を参照）。
- (4) 7月の気温は平年よりやや高く、降水量は平年並と予報されている。
- (5) 以上のことから、発生期はやや遅く、発生量は平年よりやや少ないと予想される。

**2. 防除対策**

- (1) 主要な加害種は、ツメクサガ、モンキチョウ、キタバコガ、ヨトウガである。なお、大豆では鱗翅目幼虫の密度が開花前に大豆1個体当たり1頭、開花期頃に2頭、莢伸長期以降に3頭を越えなければ、防除の必要はない。

**マメアブラムシ（小豆） 発生量：並**

**1. 発生経過と予報の根拠**

- (1) 予察ほにおける6月4半旬の寄生株率は、芽室町では0.5%（平年：0.9%）と平年並だった。長沼町（平年：11.0%）、訓子府町（平年：0.6%）では寄生が認められていない。
- (2) 7月の気温は平年よりやや高く、降水量は平年並と予報されている。
- (3) 以上のことから、発生量は平年並と予想される。

**2. 防除対策**

- (1) 寄生株が目立つ場合には、防除ガイドに準拠して茎葉散布を実施する。ただし、散布ムラによる虫の残存があったり散布後に高温少雨が続きと短期間で密度が回復する場合があるので、防除後の経過に注意する。

**E. ばれいしょ**

**疫病 発生期：やや早 発生量：並**

**1. 発生経過と予報の根拠**

- (1) 疫病は10℃を超えると病原菌の活動が始まり、18~20℃が最適温度とされている。塊茎中で越冬した菌糸が萌芽した地際部の茎に病斑を形成して伝染源となる。曇雨天が続くとまん延し、高温乾燥条件で停滞する。
- (2) ばれいしょの生育は、平年並に推移している。
- (3) 初発生期予測システム「FLABS」での「基準月日」（下記コラム参照）に25地点中22地点（6月26日現在）が達している。
- (4) 予察ほにおける「とうや」では、各地点とも初発は認められていないが、「FLABS」の「基準月日」は北斗市で6月9日（平年：6月16日）、長沼町で6月12日（平年：6月16日）、芽室町で6月13日（平年：6月23日）と平年より早く到達した。訓子府町では6月23日（平年：6月25日）と平年並に到達した。
- (5) 7月の気温は平年よりやや高く、降水量は平年並と予報されている。
- (6) 以上のことから発生期は平年よりやや早く、発生量は平年並と予想される。

**2. 防除対策**

- (1) 初発生期予測システム「FLABS」による予察情報を利用して適切な初期防除に努める。さらに降雨によって防除適期を失しないよう気象情報にも注意し、防除ガイドに準拠して薬剤散布を行う。
- (2) 初発後は急激にまん延することも懸念されるため、薬剤の散布開始が遅れないよう留意する。
- (3) メタラキシル剤には全道で広く耐性菌が認められているので、薬剤の選択には注意する。
- (4) ダブルインターバル（14日間隔）散布を行う場合は、初発前から散布を開始し、薬剤は14日間隔での指導参考薬剤を用いる。

**「FLABS」運用中**

疫病的初発生期予測システム「FLABS」（フラブス）の予測結果を病害虫防除所のホームページで随時更新しています。防除開始の参考にお役立て下さい。

「基準月日」：気象データと萌芽日から「感染好適指数」を計算し、その累積値が「21」に達した日。「初発予測日」は「基準月日」のおよそ2週間後です。

**軟腐病 発生量：並**

**1. 発生経過と予報の根拠**

- (1) 軟腐病は高温多雨な条件で発生が多く、多窒素栽培により茎葉が過繁茂に生育したり、倒伏すると多発する。
- (2) ばれいしょの生育は、平年並に推移している。
- (3) 7月の気温は平年よりやや高いと予報されているが、降水量は平年並と予報されている。
- (4) 以上のことから、発生量は平年並と予想される。

**2. 防除対策**

- (1) 防除ガイドに準拠して薬剤の予防散布を行う。特に大雨、強風および降雹によって倒伏や損傷のあったほ場では本病が多発しやすいので注意する。
- (2) 耐性菌の出現を防ぐため、同一系統の薬剤を連用しない。特にオキシリニック酸剤の低感受性菌が出現している地域があるので注意する。

**アブラムシ類** 発生期：既発（やや遅） 発生量：並

#### 1. 発生経過と予報の根拠

- (1) 予察ほのばれいしょにおけるジャガイモヒゲナガアブラムシの初発期は、訓子府町で平年よりやや遅かった。長沼町および芽室町では寄生が認められていない。訓子府町における発生量は平年よりやや少なかった。
- (2) モモアカアブラムシは、いずれの地点においても寄生が認められていない。黄色水盤における初発は、長沼町（平年：6月4半旬）で6月5半旬と平年よりやや遅い。芽室町、訓子府町（平年初発：7月中旬）では初発が認められていない。
- (3) ワタアブラムシは、長沼町において6月4半旬（平年初発：6月5半旬）に初発が認められた。
- (4) 6月3半旬の巡回調査において、一部の地点ではジャガイモヒゲナガアブラムシの寄生がわずかに認められたが、それ以外の多くの地点では寄生が認められていない。
- (5) 7月の気温は平年よりやや高く、降水量は平年並と予報されている。
- (6) 以上のことから、発生量は平年並と予想される。

#### 2. 防除対策

- (1) 防除ガイドに準拠して薬剤散布を行う。

### F. てんさい

**褐斑病** 発生期：やや早 発生量：やや多

#### 1. 発生経過と予報の根拠

- (1) 褐斑病は高温多湿な条件で多発する。
- (2) てんさいの生育は、平年並に推移している。
- (3) 予察ほでの発生は長沼町、芽室町および訓子府町（平年初発：7月中旬）のいずれにおいても確認されていない。
- (4) 7月の気温は平年よりやや高く、降水量は平年並と予報されている。
- (5) 以上のことから、発生期は平年よりやや早く、発生量は平年よりやや多いと予想される。

#### 2. 防除対策

- (1) 初発直後までに散布を開始する。
- (2) 散布間隔は14日以下とし、高温多湿条件となった場合は散布間隔を10日以下にする。
- (3) DMI剤低感受性菌が道内で確認されているため、作用機作の異なる薬剤を組み合わせた体系防除を実施する。
- (4) QoI剤耐性菌の発生が広範囲に確認されているため、褐斑病に対する防除薬剤として、QoI剤（アゾキシストロビン、クレソキシムメチル、トリフロキシストロビン）は使用しない。  
なお、根腐病および葉腐病に対するQoI剤の使用回数は、登録の範囲内とする。
- (5) カスガマイシン・銅水和剤は他の薬剤よりも残効期間が短いので使用にあたっては留意する。
- (6) 本病に特に罹病しやすい品種が栽培されている地域では本病の発生推移に注意する。

**ヨトウガ（第1回）** 発生期：既発（やや遅） 発生量：やや少

#### 1. 発生経過と予報の根拠

- (1) 前年の2回目発生量は平年より少なかったことから、越冬密度は平年より低いものと推察される。
- (2) 予察ほにおける産卵初発は、長沼町で6月3半旬（平年：6月2半旬）と平年よりやや遅く、芽室町で6月4半旬（平年：6月2半旬）と平年より遅かった。訓子府町（平年初発：6月4半旬）では産卵が認められていない。
- (3) 予察ほにおける産卵量は、長沼町、芽室町で平年よりやや少なかった。
- (4) 7月の気温は平年よりやや高く、降水量は平年並と予報されている。
- (5) 以上のことから、発生量は平年よりやや少ないと予想される。

#### 2. 防除対策

- (1) 被害株率が50%に達した時を目安に薬剤散布を実施すると、幼虫を効率的に防除でき、散布回数を1回にとどめることができる。薬剤の効果は幼虫の齢が進むにつれて低下するので、散布適期を逸しないよう注意する。

## G. たまねぎ

白斑葉枯病 発生期：既発（やや遅） 発生量：並

### 1. 発生経過と予報の根拠

- (1) 白斑葉枯病はまとまった降雨の後に気温が上昇すると初発しやすく、その後も多湿条件が続くと多発する。
- (2) 予察ほでの初発期は、長沼町では6月20日（平年：6月18日）と平年並で、訓子府町では初発を認めていない（平年：6月21日）。
- (3) 7月の気温は平年よりやや高く、降水量は平年並と予報されている。
- (4) 以上のことから、発生量は平年並と予想される。

### 2. 防除対策

- (1) 初発期の防除が重要であるため、防除開始時期を逸しないように注意する。
- (2) 本病の発生が認められたほ場では、できるだけ速やかに薬剤散布を開始する。

軟腐病 発生量：並

### 1. 発生経過と予報の根拠

- (1) 軟腐病は多雨と日照不足により発生が多くなる。
- (2) 7月の気温は平年よりやや高いと予報されているが、降水量は平年並と予報されている。
- (3) 以上のことから、発生量は平年並と予想される。

### 2. 防除対策

- (1) 防除ガイドに準拠して薬剤の予防散布を行う。
- (2) 耐性菌の出現を防ぐため、同一系統薬剤を連用しない。また、オキシリニック酸剤の低感受性菌が出現しているので注意する。

ネギアザミウマ 発生期：既発（やや遅） 発生量：やや多

### 1. 発生経過と予報の根拠

- (1) 本種は高温乾燥条件を好み、降雨によって増殖が抑制される。
- (2) 予察ほにおける成虫の初発期は、長沼町、訓子府町ともに6月2半旬（平年：6月1半旬）と平年よりやや遅かった。幼虫の初発期は長沼町で6月3半旬（平年：6月3半旬）と平年並で、訓子府町（平年初発：6月4半旬）では6月4半旬時点で発生を認めていない。
- (3) 予察ほにおける寄生株率および幼虫密度は、訓子府町で平年並、長沼町では平年よりやや低かった。
- (4) 7月の気温は平年よりやや高く、降水量は平年並と予報されている。
- (5) 以上のことから、発生量は平年よりやや多いと予想される。

### 2. 防除対策

- (1) 茎葉散布は大多数の株の中心葉に軽微な食害跡が認められてから開始する。
- (2) 近年、道内の広い範囲においてピレスロイド剤に対する抵抗性系統が確認されているため、以下に示す防除体系で対応する。
  - ① 1回目の散布には、効果の高い薬剤（プロチオホス乳剤、スピネトラム水和剤F（2,500倍））を使用する。
  - ② 同一系統薬剤を連用しない。
  - ③ 散布回数が増える場合は、効果の高い薬剤の多用を避けるため、被害抑制効果の期待できる薬剤（アセフェート水和剤、イミダクロプリド水和剤DF、スピネトラム水和剤F（5,000倍）、チオシクラム水和剤DF）も使用可能であるが、本種の密度が急激に上昇する条件下では使用を避ける。

## ネギハモグリバエのこれまでの発生状況と今後の対策

近年、道央地帯を中心にネギハモグリバエによるたまねぎのりん茎被害が発生しています。本種は、本年も同地帯において5月下旬から成虫食痕が認められ、幼虫による葉への寄生は6月上旬頃から見られています。平成26年に多発したほ場における黄色粘着トラップ調査によると、本年の誘殺頭数は、平成26年と比較して少なく推移しています（表）。幼虫による被害も平成26年と比較して軽微にとどまっています（表）。

過去3カ年の発生経過では、次世代成虫は7月上旬頃から発生し、以降ほ場内の密度が上昇する傾向が見られます。また、6月中の1回目成虫から7月の次世代にかけて、顕著な密度上昇が観察されているので、7月のネギハモグリバエ発生経過には注意が必要です。

今後もほ場観察を励行し、葉に直線状のほぼ等間隔に並ぶ成虫食痕が認められた場合、速やかに防除を開始しましょう。

表 ネギハモグリバエ多発ほ場における粘着トラップ成虫誘殺頭数と幼虫被害株率

調査年	誘殺頭数								6月下旬の 幼虫被害株率 (%)
	月. 半旬								
	5. III	5. IV	5. V	5. VI	6. I	6. II	6. III	6. IV	
H26	-	-	-	13.0	52.0	1.2	1.5	2.8	100
H27	-	-	-	0.6	0.4	0	0	0	58.7
H28	0	3.6	2.4	1.3	0.7	0	0	0	1.0
H29	0	0	0	0.3	0.7	0	0	0	4.1

注) - は粘着トラップ設置前のためデータなし

幼虫食痕、成虫食痕の写真を、北海道病害虫防除所ホームページの「ネギハモグリバエによるタマネギの食痕およびりん茎被害の特徴」に掲載していますので参考にしてください。

## H. あぶらな科野菜

**軟腐病 発生量：並**

### 1. 発生経過と予報の根拠

- (1) 軟腐病は高温多雨条件で発生が多くなる。
- (2) 7月の気温は平年よりやや高いと予報されているが、降水量は平年並と予報されている。
- (3) 以上のことから、発生量は平年並と予想される。

### 2. 防除対策

- (1) 多窒素栽培を避ける。
- (2) 防除ガイドに準拠して薬剤の予防散布を行う。
- (3) だいこんでは、播種 25～30 日後に1回目の薬剤散布を実施する。
- (4) 耐性菌の出現を防ぐため、同一系統の薬剤を連用しない。また、オキシロニック酸剤の低感受性菌が出現しているので注意する。
- (5) 銅水和剤散布時には薬害軽減のため、炭酸カルシウム剤を添加する。ただし、収穫間際には汚れを生じる場合があるので留意する。

**モンシロチョウ 発生期：既発（並） 発生量：並**

### 1. 発生経過と予報の根拠

- (1) 予察ほのキャベツにおける産卵初発は、長沼町では平年よりやや早く、北斗市では平年よりやや遅かった。幼虫の発生量は、長沼町では平年より少なく、北斗市では平年並に推移している。
- (2) 7月の気温は平年よりやや高く、降水量は平年並と予報されている。
- (3) 以上のことから、発生量は平年並と予想される。

### 2. 防除対策

- (1) 成虫の飛翔が目立ち産卵が多いほ場では、防除ガイドに準拠して薬剤散布を行う。
- (2) 防除にあたっては、他害虫の発生も考慮して、効率的な防除体系を組み立てる。

**コナガ 発生量：並**

**1. 発生経過と予報の根拠**

- (1) 予察ほのフェロモントラップにおける誘殺数は、比布町、芽室町、訓子府町では平年並だった。北斗市では平年よりやや少ない。
- (2) 予察ほのキャベツにおける幼虫の寄生頭数は、長沼町、北斗市でともに平年より少ない。
- (3) 7月の気温は平年よりやや高く、降水量は平年並と予報されている。
- (4) 以上のことから、発生量は平年並と予想される。

**2. 防除対策**

- (1) 薬剤抵抗性の発達した害虫であり、近年道内においてもジアミド系薬剤に対する抵抗性遺伝子の保持個体が確認されている。そのため、防除を行う際は以下の点に留意する。
  - ①同一系統薬剤の連用は避ける。
  - ②防除を実施した後、効果の確認に努め、防除効果が低いと判断された場合は、他系統薬剤による追加防除の実施を検討する。
  - ③所定の希釈倍数、処理量を遵守する。
- (2) 防除にあたっては、他害虫の発生も考慮して、効率的な防除に努める。

**ヨトウガ（第1回） 発生期：既発（やや遅） 発生量：やや少**

てんさいのヨトウガの項を参照。

**I. りんご**

**黒星病 発生期：既発（早） 発生量：多**

<6月12日付け注意報第2号発表>

**1. 発生経過と予報の根拠**

- (1) 黒星病は平均気温 15～20℃で降雨が多い場合に多発する。
- (2) 予察園での初発は、長沼町（無防除）の「昂林」および「つがる」ではいずれも6月1日（平年：6月18日）と平年より早かった。余市町B（慣行防除あり）の「つがる」における初発も6月20日（平年：6月26日）と平年より早かった。発生量は長沼町の「昂林」、「つがる」ともに平年より多い。
- (3) 後志、渡島地方の一般園においても、本病の発生が認められている。
- (4) 7月の気温は平年よりやや高く、降水量は平年並と予報されている。
- (5) 以上のことから、発生量は平年より多いと予想される。

**2. 防除対策**

- (1) 防除ガイドに準拠して、薬剤散布を継続する。
- (2) 発生量が増加すると、当年の被害が発生するだけにとどまらず、枝や葉で越冬した病斑が翌春の感染源となることから、重点防除時期以降も、防除を継続する。防除間隔が開きすぎないように注意する。

**斑点落葉病 発生期：並 発生量：並**

**1. 発生経過と予報の根拠**

- (1) 斑点落葉病は夏期の高湿多湿条件で多発しやすい。
- (2) 予察園での感受性品種「王林」では長沼町（無防除）および余市町C（慣行防除あり）ともに発生は認められていない。
- (3) 7月の気温は平年よりやや高いが、降水量は平年並と予報されている。
- (4) 以上のことから、発生期および発生量は平年並と予想される。

**2. 防除対策**

- (1) 防除ガイドに準拠して、薬剤散布を継続する。

**ハマキムシ類 発生期：既発（やや遅） 発生量：並**

**1. 発生経過と予報の根拠**

- (1) 予察園におけるリンゴモンハマキのフェロモントラップ誘殺開始期は、長沼町（無防除）では6月20日（平年：6月16日）と平年よりやや遅かった。慣行防除を実施している余市町Aでは6月13日（平年：6月12日）、余市町Bでは6月19日（平年：6月17日）といずれも平年並だった。リンゴコカクモンハマキのフェロモントラップ誘殺開始期は、長沼町（無防除）で6月20日（平年：6月16日）と平年よりやや遅く、余市町Aでは6月20日（平年：6月20日）と平年並であった。余市町Bでは誘殺が認められていない。
- (2) 予察園におけるリンゴモンハマキのフェロモントラップによる誘殺数は、長沼町、余市町ともに平年並だった。リンゴコカクモンハマキの誘殺数は、長沼町で平年よりやや少なく、余市町Aでは平年並だった。余市町Bでは誘殺が認められていない。
- (3) 予察園における落花直後の被害花叢率は、長沼町で平年並だった。余市町では被害が認められなかった。
- (4) 7月の気温は平年よりやや高く、降水量は平年並と予報されている。
- (5) 以上のことから、発生量は平年並と予想される。

**2. 防除対策**

- (1) 防除ガイドに準拠して薬剤散布を行う。

**モモシンクイガ 発生期：並 発生量：やや少**

**1. 発生経過と予報の根拠**

- (1) 一般園における前年の発生量は平年よりやや少なかったことから、越冬密度は平年よりやや低いと推測される。
- (2) 予察園のフェロモントラップによる誘殺開始期は、長沼町（無防除）で6月20日（平年：6月18日）、慣行防除を実施している余市町Aでは6月20日（平年：6月19日）と平年並だった。余市町Bでは6月20日（平年：6月17日）と平年よりやや遅かった。
- (3) りんごの生育は平年並に推移している。
- (4) 7月の気温は平年よりやや高く、降水量は平年並と予報されている。
- (5) 以上のことから、産卵開始期は平年並で、発生量は平年よりやや少ないと予想される。

**2. 防除対策**

- (1) 防除ガイドに準拠して薬剤散布を行う。

**ハダニ類 発生量：やや少**

**1. 発生経過と予報の根拠**

- (1) リンゴハダニおよびナミハダニは、長沼町（無防除）、余市町（慣行防除あり）いずれの予察園においても、両種ともに発生が認められていない。
- (2) ハダニ類は高温乾燥条件での発生が多く、冷涼多雨条件では発生が少ない。
- (3) 7月の気温は平年よりやや高いものの、降水量は平年並と予報されている。
- (4) 以上のことから、発生量は平年よりやや少ないと予想される。

**2. 防除対策**

- (1) 薬剤抵抗性の発達が認められているので、防除ガイドに準拠し、異なる系統の薬剤をローテーション散布する。

**キンモンホソガ 発生期：並 発生量：並**

**1. 発生経過と予報の根拠**

- (1) 予察園のフェロモントラップによる誘殺数は、長沼町（無防除）、余市町（慣行防除あり）いずれにおいても平年並だった。
- (2) 予察園における被害は、長沼町（無防除）、余市町（慣行防除あり）いずれにおいても認められていない。
- (3) 7月の気温は平年よりやや高く、降水量は平年並と予報されている。
- (4) 以上のことから、発生期、発生量ともに平年並と予想される。

**2. 防除対策**

- (1) 防除ガイドに準拠して薬剤散布を実施する。

## 付記

### 北海道地方 3か月予報 (7月から9月までの天候見通し)

平成29年6月23日  
札幌管区气象台 発表

#### <予想される向こう3か月の天候>

向こう3か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

この期間の平均気温は、高い確率50%です。

7月 北海道日本海側・オホーツク海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。北海道太平洋側では、平年と同様に曇りの日が多いでしょう。気温は、平年並または高い確率ともに40%です。

8月 天気は数日の周期で変わるでしょう。気温は、高い確率50%です。

9月 天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。気温は、高い確率50%です。降水量は、平年並または多い確率ともに40%です。

#### <向こう3か月の気温、降水量の各階級の確率(%)>

##### <<気温>>

[北海道地方]

3か月	20	30	50
7月	20	40	40
8月	20	30	50
9月	20	30	50

■低い □平年並 ■高い

##### <<降水量>>

[北海道地方]

3か月	30	30	40
7月	30	40	30
8月	30	40	30
9月	20	40	40

■少ない □平年並 ■多い

**6月15日～8月31日は農薬危害防止運動実施期間です！**

北海道では、農薬の使用に伴う事故・被害を防止するため、農薬を使用する機会が増える6月から8月を期間として、農薬の安全かつ適正な使用や保管管理等を推進する「**農薬危害防止運動**」を実施します。

北海道農政部生産振興局技術普及課  
(TEL 011-231-4111 (内線)27-838)  
北海道病害虫防除所  
(TEL 0123-89-2080)  
各総合振興局・振興局農務課



■ **農薬使用に関する注意事項**

- 農薬は、農薬取締法に定められた事項が表示されたもの、または特定農薬に該当するものを選び、有効期限内に使い切れる量を購入する。
- 農薬のラベルに記載されている適用作物、使用時期、使用方法等を読んで、十分理解し、表示された濃度や使用量等を守り、必要量以上に農薬を調製しない。
- 散布作業前日は、飲酒を控え、十分な睡眠をとる。体調が優れないときや著しく疲労しているときは、散布作業に従事しない。
- 農薬の使用前には、防除器具等を点検し、十分に洗浄がなされているか確認する。また、農薬の使用後には、防除器具の薬液タンク、ホース、噴頭、ノズル等農薬残留の可能性がある箇所に注意して、洗浄を十分に行う。
- 農薬を散布するときは、必要に応じ、あらかじめ周辺住民等に周知するとともに、看板等を立てるなど現場に近づかないよう配慮する。  
特に無人ヘリで防除する場合は、学校や病院等の公共施設及び近隣の住民等に対し、実施予定日時、区域、薬剤等についての事前周知に努める。
- 農薬の飛散による危害を防止するため、近隣の住民、飼育されている家畜及び蜜蜂、河川等の周辺環境への影響に注意する。  
特に無人ヘリで薬剤散布する場合は、有機農産物が生産されているほ場等に農薬が飛散しないよう注意する。
- 農薬の調製及び散布作業中は、マスク、手袋、眼鏡等を着用し、体を防護する。
- 散布作業後は、よくうがいをし、手や顔などの露出部だけでなく入浴し全身を十分洗う。

★ **農薬情報の掲載サイト**

農薬の登録情報や農薬取締法等については、農林水産省ホームページの「農薬コーナー」(<http://www.maff.go.jp/nouyaku/>) をご覧ください。

